

Efectos del tratamiento somático del intento y conducta suicida

Elise M Hawkins et al. Brain and Behavior. Septiembre 2021

Abstract:

Objetivo: Este trabajo se realizó para definir y caracterizar el papel de los tratamientos somáticos actualmente disponibles en psiquiatría para aumentar o reducir el riesgo de suicidio.

Métodos: Los miembros del Grupo de Trabajo para la Prevención del Suicidio de la Red Nacional de Centros de Depresión realizaron una revisión de la literatura de los tratamientos somáticos que se sabe que aumentan o reducen el riesgo de suicidio. Las revisiones se aventuraron a incluir toda la información relevante sobre el riesgo tanto de ideación suicida como de suicidios consumados.

Resultados: el litio y la clozapina son los únicos dos tratamientos somáticos que tienen datos de alta calidad que documentan sus efectos antisuicidas en los trastornos del estado de ánimo y la esquizofrenia, respectivamente. La interrupción del tratamiento con litio también se asocia con un mayor riesgo de suicidio. La ketamina y la esketamina pueden tener un efecto antisuicida pequeño, pero inmediato. A pesar de la reciente aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos del uso de esketamina en pacientes deprimidos con suicidio, la pequeña sobrerrepresentación desproporcionada del suicidio en sujetos que habían recibido esketamina frente a placebo (3 frente a 0 entre > 3500 sujetos) requiere una evaluación continua. El supuesto efecto antisuicida de la terapia electroconvulsiva se basa en datos de baja calidad. El efecto de los antidepresivos no está del todo claro. Parece haber evidencia directa de que los antidepresivos aumentan la ideación suicida y el riesgo de suicidio a corto plazo en los jóvenes, pero evidencia indirecta (de baja calidad) de que los antidepresivos reducen el riesgo de suicidio a largo plazo.

Conclusiones: Los médicos cuentan con una farmacopea en expansión para abordar el potencial suicida de sus pacientes. Algunos de los agentes con efectos antisuicidas documentados también pueden aumentar la tendencia al suicidio en circunstancias específicas.

Leer texto completo 23 páginas

<https://docs.google.com/document/d/1WiJpwg3G3X72dDGQe9EWpveT HA4xQfp-/edit>